



Wyrób Medyczny CE 0481

Obesimed Forte

Nadwaga 10 kg lub więcej

- Do leczenia nadwagi
- Redukuje apetyt i zapobiega przejadaniu się
- Przyczynia się do znacznej utraty masy ciała

Zalecenia ogólne: Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed przyjęciem Obesimed® Forte, nawet jeśli używałeś tego produktu wcześniej, ponieważ od czasu otwarcia ostatniego opakowania mógł on zostać zmieniony zgodnie z wynikami najnowszych badań. Nie potrzebujesz recepty na ten wyrób medyczny. Niemniej jednak, aby osiągnąć dobry wynik musisz używać Obesimed® Forte ostrożnie i zgodnie z zaleceniami. Zachowaj tę instrukcję użycia w razie potrzeby ponownego skonsultowania.

Kto powinien przyjmować Obesimed® Forte? Obesimed® Forte jest wyrobem medycznym spożywanym w celu redukcji wagi. Jest przeznaczony dla osób dorosłych w wieku 18 lat i powyżej, które mają nadwagę więcej niż 10 kilogramów lub Indeks Masy Ciała (BMI) 28 lub wyższy. Aby zagwarantować dobre wyniki, zaleca się, by Obesimed® Forte był stosowany obok diety o obniżonej kaloryczności.

BMI to sposób na określenie, czy masz zdrową masę ciała lub czy masz nadwagę w odniesieniu do swojego wzrostu.

Odszukaj swój wzrost w tabeli.

Jeśli twoja waga jest niższa niż masa pokazana dla twojego wzrostu, nie bierz Obesimed® Forte.

Wzrost	Waga
1.50 m	63 kg
1.55 m	67.25 kg
1.60 m	71.75 kg
1.65 m	76.25 kg
1.70 m	81 kg
1.75 m	85.75 kg
1.80 m	90.75 kg
1.85 m	95.75 kg
1.90 m	101 kg

Indeks BMI ma zastosowanie tylko u dorosłych i nie może być stosowany w odniesieniu do wszystkich przypadków. Nie ma zastosowania u dzieci, kobiet w ciąży lub sportowców wyczynowych.

Jak działa Obesimed® Forte: Obesimed® Forte oferuje nowe podejście do utraty wagi dzięki zastosowaniu kombinacji wysoko oczyszczonych i naturalnie lepkich polisacharydów, które wzajemnie zwielokrotniają swój efekt działania. W ciągu 30 minut do godziny od zażycia Obesimed® Forte absorbuje wodę w ilości kilkuset razy większej od jego własnej wagi. Po rozpuszczeniu się kapsułki w żołądku rozszerza się, stając się bardzo lepką, stabilną masą żelową. To stwarza uczucie sytości, dzięki czemu można zmniejszyć wielkość porcji przyjmowanych posiłków i łatwiej utrzymać dietę o ograniczonej kaloryczności. Po posiłku masa żelowa miesza się z pożywieniem. To nie tylko redukuje apetyt, ale również spowalnia proces trawienia. Obesimed® Forte powoduje zmniejszenie uczucia głodu z powodu wypchnięcia żołądka i zapewnia zachowanie zdrowego poziomu cukru we krwi.

Dawkowanie i stosowanie: Weź 1 do 2 kapsułek 3 x dziennie, na 1 godzinę przed każdym posiłkiem, popijając z co najmniej 1 szklanką wody. Kapsułkę należy połykać w całości.

Skuteczne dawkowanie może być różne dla każdej osoby i może się wahać od 1 do 2 kapsułek na dawkę do maksymalnej dawki 6 kapsułek 3 x dziennie.

Dawkę można zwiększać co 3 dni o 1 kapsułkę na posiłek do czasu, kiedy uczucie głodu pomiędzy posiłkami znacznie się zmniejszy. Nie przekraczać maksymalnej dawki.

Nie stosować Obesimed® Forte dłużej niż 30 dni w czasie jednej kuracji. Leczenie można wznowić po 4 dniach.

Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci.

Składniki: Produkt oparty na składnikach roślinnych: Omtec19®, Amylum Solani, Omtec20®, Hypromelozza (E464), Oleum Helianthus, Tlenek tytanu (E171).
Produkt może być stosowany przez wegetarian.

Alergeny: Ten produkt nie zawiera alergenów.

Używanie w czasie ciąży i / lub karmienia piersią: utrata wagi w czasie ciąży lub karmienia piersią nie jest zalecana, ponieważ szkodliwe substancje z tkanki tłuszczowej (nazywanej również tłuszczem ciała) mogą być przekazywane dziecku. Dlatego nie zaleca się w tym okresie stosowania Obesimed® Forte.

Używanie w połączeniu z innymi lekami: Obesimed® Forte obniża poziom glukozy we krwi. Jeśli masz cukrzycę, ważne jest, aby prawidłowo monitorować poziom cukru we krwi. Skonsultuj się z lekarzem, ponieważ jest możliwe, że twoje leki na cukrzycę wymagają dostosowania dawki.

Stosowanie Obesimed® Forte w połączeniu z innymi suplementami diety lub lekami o działaniu hipoglikemicznym nie jest zalecane, jeżeli wcześniej nie skonsultowano się z lekarzem lub farmaceutą.

Obesimed® Forte spowalnia tempo wchłaniania pokarmu i może teoretycznie mieć podobne działanie w odniesieniu do leków. Doustne leki muszą być spożywane 1 godzinę przed lub 4 godziny po użyciu Obesimed® Forte. Jeśli zażywasz inne leki, przed rozpoczęciem stosowania Obesimed® Forte skonsultuj się z twoim lekarzem lub farmaceutą.

Multivitaminy i Obesimed® Forte: Podczas odchudzania i używania Obesimed® Forte każdego dnia należy przyjmować multivitaminy i preparaty mineralne. Obesimed® Forte obniża poziom niektórych witamin i minerałów wchłanianych przez organizm. Najlepiej zażywać witaminy i składniki mineralne przed snem, aby zapewnić, że są one wchłaniane przez organizm.



Ostrzeżenia:

- Nie używaj Obesimed® Forte w następujących sytuacjach:
 - Jeśli masz nadwrażliwość na jeden lub więcej składników;
 - Jeśli cierpisz na zaburzenia żołądkowo-jelitowe;
 - Jeśli cierpisz na zwięźnięcie przełyku lub wcześniej cierpiełeś na nieprawidłowości pracy jelit;
 - Podczas ciąży lub karmienia piersią.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, czy możesz użyć Obesimed® Forte i / lub czy możesz zastosować go w połączeniu z lekami, najpierw skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie otwieraj kapsułek przed użyciem.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Możliwe działania niepożądane: Obesimed® Forte jest dobrze tolerowany, ale może prowadzić do kilku skutków ubocznych, chociaż nie wszyscy cierpią z ich powodu.

Początkowo mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowe i jelitowe takie jak cienkie lub luźne stolce, łagodna biegunka, refluks i tworzenie się gazów lub zaparcia. Zwykle te działania niepożądane znikają po kilku dniach. Aby ich uniknąć, zacznij od małej dawki (1 kapsułka na posiłek) i następnie stopniowo zwiększaj dawkowanie, do momentu, aż organizm się przystosuje. Jeśli któryś z tych efektów ubocznych stanie się poważny lub jeśli zauważysz jakiegokolwiek skutki uboczne niewymienione w tej instrukcji użytkowania, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zawartość: 42 kapsułek



Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C) w suchym i ciemnym miejscu w oryginalnym pojemniku i poza zasięgiem małych dzieci.

Wyrób medyczny: Obesimed® Forte jest wyrobem medycznym klasy IIa zgodnie z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EWG.



Data ważności: Używanie Obesimed® Forte po dacie podanej na opakowaniu oznaczonej jako „data ważności” nie jest zalecane.

Data ostatniej aktualizacji tych informacji:
Styczeń 2019 – 074566 V3.5



PK Benelux BV,
Vluchttoord 17,
5406 XP Uden, Netherlands

CE 0481

dla:

Aurea Pharma, Kalinowa 11, 05-830 Nadarzyn, PL
www.aureapharma.eu